

本邦産 *Polietes* 属 2 種 (双翅目, 家蠅科)

加 藤 静 夫

TWO UNRECORDED SPECIES OF THE GENUS *POLIETES*
(DIPT. MUSCIDAE) FROM JAPAN.

By SIZUO KATO.

Polietes 属はイヘバヘ科 (Muscidae) のトゲハナバヘ亜科 (*Phaeninae*) に編入さるべき本邦より未記録の 1 属であるが、著者は本邦産イヘバヘ科中に本属に属する 2 未記録種を査定し得たので、茲に小文を草して記録することとした。

トゲハナバヘ亜科は胸側下刺毛 (hypopleural bristles) を缺く；普通中脈は先端彎曲せず翅端まで真直ぐに延長してゐる；臀脈は翅の縁端まで達せず、途中で消失してゐる；後肢脛節の外側、中央より先端に近い箇所に必ず顕著な 1 本の長剛毛を有する等の點で他の亜科と區別することが出来る。

Polietes 属は 1866 年に RONDANI 氏 (Bull. Soc. Milano, IX, p. 91) によつて創設せられたものであつて、その主な特徴を述べれば次の如くである。即ち複眼には細毛密生し、觸角刺毛は長羽毛状をなす。中刺毛 (acrostical bristles) は極めて顯著で 2 列をなし、菱狀部を除く中胸背の全長に亘りて生ず。翅の第 4+5 徑脈合脈 (r_{4+5}) の基部に數本の細毛を列生す。腹部は短太で、表面灰色粉を裝ひ、光線の具合で不規則な斑紋を顯はす。

種 の 檢 索 表

- 1(2) 平均棍は黄褐色。中脈の前半が前横脈と後横脈とで區切られる 2 切片の長さを比較すると、後横脈と翅端間の方が前横脈と後横脈間より長い (Fig. 1. $ab < bc$).....*P. albolineata* FALLÉN
- 2(1) 平均棍は黒褐色。上記中脈の 2 切片の長さは逆に前横脈と後横脈間

の方が後横脈と翅端間より長い (Fig. 2, $ab > bc$).....

.....*P. lardarius* FABRICIUS




Fig. 1. *Polietes albolineata*
FALLÉN の翅




Fig. 2. *Polietes lardarius*
FABRICIUS の翅

1. *Polietes albolineata* FALLÉN

Musca albolineata FALLÉN, *Musc.*, p. 54, 38 (1823)

Anthomyia albolineata MEIGEN, *S. B.*, V, p. 83 (1826); WALKER, *Ins. Brit.*, II, p. 119 (1853).

Aricia albolineata SCHINER, *Fauna Austriaca*, I, p. 601 (1862).

Polietes albolineata MEADE, *Descr. List. Brit. Anth.*, 1, p. 3 (1897); SCHINABL and DZIEDZICKI, *Nova Acta, Die Anthomyiden*, p. 219 [167] (1911); STEIN, *Arch. für Naturgesch.*, LXXXI, 1915, Abt. A, Heft 10, p. 20 (1916); SÉGUY, *Dipt. Anthomyides*, p. 339 (1923); KARL, *Tierwelt Deutsch.*, Teil 13, III: *Muscidae*, p. 18 (1928)

産地—樺太： 1 ♂ 1 ♀, 小沼, 23/VII, 1934, 渡邊千尙・井上武; 2 ♂ ♂, 一の澤, 15/VIII, 1923, 松村松年。

北海道： 1 ♀, 札幌, 採集年月日不明, 高野秀三。

分 布： 歐洲, 日本。

體は光澤のある黒色で, 胸背を後方より見ると3條の太い白色縦線があり, 中央のものは菱狀部に達し, 兩側のものは翅の基部で止る。腹部は黒色であるが, 稍青色を帯びた白色粉を以て覆はれ, 光線により不規則な斑紋を顯はすが, 腹背の中央には黒色の細い1縦線がある。本種は一見 *Morellia hortorum* FALLÉN (セジロハナバヘ) に極めて酷似してゐるが, 中脈が眞直ぐに翅端まで延長して

ゐる點で明らかに區別が出来る。

體 長: 6.5~7.5 mm.

2. *Polietes lardaria* FABRICIUS

Musca lardaria FABRICIUS, Spec. Ins., II, p. 436, 5 (1781).

Anthomyia lardaria MEIGEN, S. B., V, p. 83 (1826); WALKER, Ins. Brit., II, p. 119 (1853).

Aricia lardaria SCHINER, Fauna Austriaca, I, p. 601 (1862).

Polietes lardaria MEADE, Descr. List. Brit. Anth., 1, p. 3 (1897); SCHNABL and DZIEDZICKI, Nova Acta, Die Anthomyiden, p. 219 [167] (1911); SÉGUY, Dipt. Anthomyides, p. 340 (1923); KARL, Tierwelt Deutsch., Teil 13, III: Muscidae, p. 19 (1928).

産 地—北海道: 1 ♀, 札幌, 3/X, 採集年不明, 松村松年; 1 ♀, 定山溪, 5/IX, 採集年不明, 松村松年; 1 ♀, 札幌, IX, 1922, 高野秀三。

本 州: 2 ♀♀, 八幡平(秋田縣), 3/VIII, 1932, 著者。

分 布: 歐洲, 日本。

體は黒色で, 胸背には淡い白色粉を裝ひ, 黒色の4縦線がある。腹部の色彩は前種と略同様である。本種は一見 *Muscina pabulorum* FALLÉN (オホセアカクロバへ) に酷似してゐるが, 中脈の先端が彎曲してゐないことと, 菱狀部の先端が赤褐色を呈してゐない點で明らかに區別が出来る。著者は本種を山地の繖形科雜草の花上で採集した。

體 長: 11~12 mm.